

Patient Education

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector)

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

发音

(KO vid nine teen vak SEEN ad e noh VYE rus vek tor)

品牌名称：美国

Janssen COVID-19 Vaccine

品牌名称：加拿大

AstraZeneca COVID-19 Vaccine; Covishield; Janssen COVID-19 Vaccine

此药有何用途？

- 此药用于预防 COVID-19。

在服用此药前我需要告诉我的医生什么东西？

- 如果您对此药物、此药的任何成分（包括聚山梨醇酯八十）；或任何其他药物、食品或物质（包括聚乙二醇）过敏。请将您的过敏情况及体征告知医生。
- 如果您感染了 COVID-19，如果您出现任何可能由 COVID-19 引起的症状，或者如果您正在等待 COVID-19 检测结果，或近期感染了 COVID-19。
- 如果您出现伴有发热的疾病。
- 若您有出血的问题。
- 如果您曾经有过血栓和血小板水平低等健康问题，例如肝素诱导的血小板减少 (HIT)。
- 如果您正在服用阿司匹林或血液稀释药。
- 如果您注射过不同的 COVID-19 疫苗。

- 如果您在过去 14 天内接触过感染了 COVID-19 的人士。
- 如果您在过去 90 天内接受过使用其他药物或血浆对 COVID-19 感染进行治疗。
- 这不是可与本药物发生相互作用的所有药物或健康问题列表。
- 将您的所有用药（处方药或非处方药、天然产品、维生素）及健康问题告知医生和药剂师。您必须确认在您当前身体状况并服用您所有药物的情况下服用本药是安全的。在未向医生确认前，不要开始、停止或更换任何药物的剂量。

服用此药期间我需要知道些什么或做些什么？

- 告诉您的所有医务人员您正在使用此药。包括您的医生、护士、药剂师及牙医。
- 该疫苗不能导致感染 COVID-19。
- 有些产品以 1 剂的形式给药，而其他产品则需要 2 剂。如果您不确定，请咨询您的医生或药剂师。
- 目前尚不清楚接种此疫苗的人将在多长时间内免受 COVID-19 感染。
- 像所有疫苗一样，此疫苗可能无法保护所有注射过疫苗的人。如果您有疑问，请咨询医生。
- 如果您在注射一剂后有副作用，对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)，如布洛芬或萘普生可能会有所帮助。
- 接种疫苗后，请按照当地公共卫生官员的建议继续采取防止 COVID-19 传播的措施。这些措施包括常洗手、戴口罩、与他人保持至少 1.8 米（6 英尺）的距离以及避免聚集。
- 若您的免疫系统功能低下或您正在使用抑制免疫系统的药物，请咨询医生。此疫苗效果可能并不好。
- 罕见的情况下，在研究中出现过贝尔氏麻痹病例。尚不确定此疫苗是否是病因。如果您曾经患过贝尔氏麻痹，请告知您的医生。如果您的脸部一侧有肌肉虚弱或下垂等症状，请立即致电您的医生。
- 目前尚不确定此疫苗是否会影响某些结核病 (TB) 检查。如果您需要接受 TB 检查，请咨询您的医生。

- **若您已怀孕、计划怀孕或在喂养母乳**，请告知医生。您需要咨询了解您和婴儿使用本药的受益和风险。

发生哪些副作用时我需要立即打电话给医生？

- **警告/注意事项：** 尽管罕见，但一些人在服用此药时可有非常严重甚至是致命的副作用。如果您有任何以下可能与非常严重副作用相关的迹象或症状，请告诉您的医生或立即进行医疗：
 - **过敏反应体征**，例如：出疹；荨麻疹；发痒；皮肤发红、肿胀、起泡或脱皮，伴或未伴发热；哮喘；胸部或咽喉紧迫感；呼吸、吞咽或言语困难；异常声嘶；或口部、面部、嘴唇、舌或咽喉肿胀。
 - **心跳过速、头晕、昏倒或虚弱**。这些可能是过敏反应或其他类型的反应的其他症状。
 - **接种这种疫苗的极少数人发生血栓形成伴血小板水平低（有时出血）**。这种情况在 50 岁以下的女性中更为常见。大多数是在接种疫苗后 3 周内发生。这有时是致命的。这些血栓会在不同的位置发生，包括大脑、胃和腿部。如果您出现以下指征，请立即联系医生。远离注射部位的瘀伤或小血斑、严重的头痛、持续存在的头痛、持续存在的胃痛、腿部肿胀或疼痛、胸痛、呼吸急促、视力模糊、癫痫或意识混乱。

此药有哪些其他副作用？

- 所有药物都可造成副作用。但很多人无副作用或仅有轻微的副作用。如果这些副作用或任何其他副作用影响您或不能消失，请致电您的医生或寻求医疗：
- **注射部位疼痛、发红或肿胀，头痛，肌肉或关节疼痛，发烧到 38°C (100.4°F) 或更高，寒战，恶心，或感觉疲惫或不适**。大多数副作用较为轻微。这些症状大多在注射后 1 至 2 天内消失。
- 这些并非可能发生的全部副作用。如果有您对副作用有问题，请联系医生。请联系医生了解有关副作用的医学建议。
- 您可将副作用报告给您的国家卫生部门。
- 请访问 <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> 或致电 1-800-822-7967，向美国食品药品监督管理局 (FDA)/美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的疫苗不良事件报告系统 (VAERS) 报告副作用。还有一个名为 V-safe 的智能手机工具，可以用来检查您的身体状况并报告副作用。

这可以在 <https://vsafe.cdc.gov> 找到。如果您需要 V-safe 方面的帮助，请拨打 1-800-232-4636。

此药的最佳服用方式是？

- 谨遵医嘱使用此药。仔细阅读向您提供的所有信息。严格遵循所有说明。
- 此药用于肌肉注射。
- 在您接受此药期间及服药后的一段时间将对您进行密切观察。请咨询您的医生。

如果我漏服一剂，我该怎么办？

- 打电话给医生询问该怎么做。

如何储存和/或处置此药？

- 该针剂需要您前往医疗卫生机构接受注射。您不能将其存放于家中。

一般药物事实

- 如果您的症状或健康问题未好转或变得更严重，请联系医生。
- 勿与他人共用您的药物也勿服用他人的药物。
- 将所有药品放在安全的地方。将所有药物放在儿童及宠物接触不到的地方。
- 丢弃未使用或过期的药物。除非遵照嘱咐，否则请勿冲入马桶或倒入排水管。如果您对扔掉药物的最好方式有疑问，请咨询药剂师。您所在的地区可能有药物回收计划。
- 一些药物可能有另一份病人须知。如果您对本药有任何问题，请咨询医生、护士、药剂师或其他医务人员。
- 如果您认为使用过量了，请致电当地毒物控制中心或立即进行医疗。准备好告知或出示服用了什么、服用多少及何时服用。

消费者信息使用及免责声明: 不应使用本信息决定是否服用本药或任何其它药物。只有您的医疗服务提供者具备决定哪些药物适合特定患者的知识和培训。本信息不保证任何药物是安全、有效的，也不保证任何药物被批准用于治疗任何患者或健康问题。这仅仅是本药物的一般信息的简明概要。本信息并未包括可能适用于本药的可能用法、说明、警告、注意事项、相互作用、不良作用或风险的所有信息。本信息并非具体医学建议，不能替代您自医疗服务提供者获得的信息。有关

使用本药的风险和益处的完整信息请咨询医疗服务提供者。此信息的使用受 Lexicomp 最终用户许可协议的约束，请访问 <https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula>。

Last Updated 7/15/21



© 2021 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.