

Patient Education

COVID-19 Vaccine (mRNA)

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

发音

(KO vid nine teen vak SEEN m R N A)

品牌名称：美国

Comirnaty; Moderna COVID-19 Vaccine; Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

品牌名称：加拿大

COVID-19 Vaccine Moderna; Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

此药有何用途？

- 此药用于预防 COVID-19。

在服用此药前我需要告诉我的医生什么东西？

- 如果您对此药、此药的任何成分（包括聚乙二醇）或任何其他药物、食品或物质（包括聚山梨醇酯）过敏。请将您的过敏情况及体征告知医生。
- 如果您感染了 COVID-19，如果您出现任何可能由 COVID-19 引起的症状，或者如果您正在等待 COVID-19 检测结果，或近期感染了 COVID-19。
- 如果您出现伴有发热的疾病。
- 如果您曾出现某些心脏问题（心肌炎，心包炎）。
- 若您有出血的问题。
- 如果您正在服用阿司匹林或血液稀释药。
- 如果您注射过不同的 COVID-19 疫苗。

- 如果您在过去 14 天内接触过感染了 COVID-19 的人士。
- 如果您在过去 90 天内接受过使用其他药物或血浆对 COVID-19 感染进行治疗。
- 这不是可与本药物发生相互作用的所有药物或健康问题列表。
- 将您的所有用药（处方药或非处方药、天然产品、维生素）及健康问题告知医生和药剂师。
 - 您必须确认在您当前身体状况并服用您所有药物的情况下服用本药是安全的。在未向医生确认前，不要开始、停止或更换任何药物的剂量。

服用此药期间我需要知道些什么或做些什么？

- **适用于服用本药的所有患者：**
- 告诉您的所有医务人员您正在使用此药。包括您的医生、护士、药剂师及牙医。
- 该疫苗不能导致感染 COVID-19。
- 您需要接种 2 剂此疫苗。为了获得最佳预防效果，两剂都必须注射。确保您知道何时回去注射第二剂。如果您在注射第一剂后出现严重反应，请咨询您的医生。
- 目前尚不清楚接种此疫苗的人将在多长时间内免受 COVID-19 感染。
- 像所有疫苗一样，此疫苗可能无法保护所有注射过疫苗的人。如果您有疑问，请咨询医生。
- 如果您在注射一剂后有副作用，对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)，如布洛芬或萘普生可能会有所帮助。
- 在注射第二剂后，副作用可能会更频繁地发生。如果您对第二剂有疑问，请咨询医生。
- 接种疫苗后，请按照当地公共卫生官员的建议继续采取防止 COVID-19 传播的措施。这些措施包括常洗手、戴口罩、与他人保持至少 1.8 米（6 英尺）的距离以及避免聚集。
- 若您的免疫系统功能低下或您正在使用抑制免疫系统的药物，请咨询医生。此疫苗效果可能并不好。
- 如果您注射了皮下填充剂，请咨询您的医生。罕见情况下，在注射此疫苗后，曾发生填充部位或附近肿胀（通常在面部或嘴唇）。这种情况发生时，不会持续很长时间，并会通过治疗而消失。

- 罕见的情况下，在研究中出现过贝尔氏麻痹病例。尚不确定此疫苗是否是病因。如果您曾经患过贝尔氏麻痹，请告知您的医生。如果您的脸部一侧有肌肉虚弱或下垂等症状，请立即致电您的医生。
- 目前尚不确定此疫苗是否会影响某些结核病 (TB) 检查。如果您需要接受 TB 检查，请咨询您的医生。
- 若您已怀孕、计划怀孕或在喂养母乳，请告知医生。您需要咨询了解您和婴儿使用本药的受益和风险。
- **儿童：**
 - 此药不适用于所有年龄的儿童。将该药用于儿童之前，请先咨询医生。

发生哪些副作用时我需要立即打电话给医生？

- **警告/注意事项：** 尽管罕见，但一些人在服用此药时可有非常严重甚至是致命的副作用。如果您有任何以下可能与非常严重副作用相关的迹象或症状，请告诉您的医生或立即进行医疗：
 - 过敏反应体征，例如：出疹；荨麻疹；发痒；皮肤发红、肿胀、起泡或脱皮，伴或未伴发热；哮喘；胸部或咽喉紧迫感；呼吸、吞咽或言语困难；异常声嘶；或口部、面部、嘴唇、舌或咽喉肿胀。
 - 心跳加快或减慢、头晕、昏迷、虚弱、焦虑、意识模糊或视力或听力发生改变。这些可能是过敏反应或其他类型的反应的其他症状。
 - mRNA COVID-19 疫苗很少导致某些心脏问题。症状大多在接种第二剂次后的几天内开始出现。如果您出现胸痛、呼吸急促，或您感觉自己心跳加快、心脏颤动或剧烈跳动，请立即联系医生。

此药有哪些其他副作用？

- 所有药物都可造成副作用。但很多人无副作用或仅有轻微的副作用。如果这些副作用或任何其他副作用影响您或不能消失，请致电您的医生或寻求医疗：
- 注射部位疼痛、发红或肿胀；头痛；肌肉或关节疼痛；发烧到 38°C (100.4°F) 或更高；发冷；胃部不适、呕吐或腹泻；腺体肿胀或压痛；或感觉疲惫或不适。大多数副作用为轻微到中度。这些症状大多发生在注射后 3 天内，并在 1 至 3 天内消失。

- 在第一次注射后几天至几周内，注射部位会发生疼痛、发红或肿胀。如果发生这种情况，请咨询医生。通过另一只手臂注射第二剂。
- 这些并非可能发生的全部副作用。如果有您对副作用有问题，请联系医生。请联系医生了解有关副作用的医学建议。
- 您可将副作用报告给您的国家卫生部门。
- 请访问 <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> 或致电 1-800-822-7967，向美国食品药品监督管理局 (FDA)/美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的疫苗不良事件报告系统 (VAERS) 报告副作用。还有一个名为 V-safe 的智能手机工具，可以用来检查您的身体状况并报告副作用。这可以在 <https://vsafe.cdc.gov> 找到。如果您需要 V-safe 方面的帮助，请拨打 1-800-232-4636。

此药的最佳服用方式是？

- 谨遵医嘱使用此药。仔细阅读向您提供的所有信息。严格遵循所有说明。
- 此药用于肌肉注射。
- 在您接受此药期间及服药后的一段时间将对您进行密切观察。请咨询您的医生。

如果我漏服一剂，我该怎么办？

- 联系医生询问该怎么做。为了获得最佳的 COVID-19 预防效果，请勿遗漏或跳过第二剂。

如何储存和/或处置此药？

- 该针剂需要您前往医疗卫生机构接受注射。您不能将其存放于家中。

一般药物事实

- 如果您的症状或健康问题未好转或变得更严重，请联系医生。
- 勿与他人共用您的药物也勿服用他人的药物。
- 将所有药品放在安全的地方。将所有药物放在儿童及宠物接触不到的地方。
- 丢弃未使用或过期的药物。除非遵照嘱咐，否则请勿冲入马桶或倒入排水管。如果您对扔掉药物的最好方式有疑问，请咨询药剂师。您所在的地区可能有药物回收计划。

- **一些药物可能有另一份病人须知。**如果您对本药有任何问题，请咨询医生、护士、药剂师或其他医务人员。
- **如果您认为使用过量了，请致电当地毒物控制中心或立即进行医疗。**准备好告知或出示服用了什么、服用多少及何时服用。

消费者信息使用及免责声明: 不应使用本信息决定是否服用本药或任何其它药物。只有您的医疗服务提供者具备决定哪些药物适合特定患者的知识和培训。本信息不保证任何药物是安全、有效的，也不保证任何药物被批准用于治疗任何患者或健康问题。这仅仅是本药物的一般信息的简明概要。本信息并未包括可能适用于本药的可能用法、说明、警告、注意事项、相互作用、不良作用或风险的所有信息。本信息并非具体医学建议，不能替代您自医疗服务提供者获得的信息。有关使用本药的风险和益处的完整信息请咨询医疗服务提供者。**此信息的使用受 Lexicomp 最终用户许可协议的约束，请访问 <https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula>。**

Last Updated 9/2/21



© 2021 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.