

Patient Education

2019 冠状病毒病 (COVID-19) 检测

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

为什么要做这个手术？

2019 冠状病毒病也称为 COVID-19。它由一种称为 SARS 相关冠状病毒 (SARS-CoV-2) 的病毒引起。医生可能会要求进行检测，以确定您目前是否感染 COVID-19。他们还可能检测您过去是否患 COVID-19。

了解您接受的检测类型非常重要。医生利用病毒检测确定您是否患有 COVID-19。通常使用鼻拭子或喉拭子。血液检查是 COVID-19 检测的另一种方式，用于确定您体内是否已对该病毒产生抗体。如果您有抗体，这意味着您曾经感染过该病毒。

结果将是什么？

病毒检测（鼻拭子或喉拭子）：

- 医生将查看您的检测结果。医生可能会得知您有疾病体征。这种疾病很容易传播给他人，或者您患重病的风险更大。
- 如果结果为阳性，则表示您有活动性感染。您可能出现或未出现该疾病的症状。
- 如果结果为阴性，则表示您在检测时很可能未受到感染。您的症状可能来自一些其他类型的疾病。这并不意味着您不会患 COVID-19。

血液检查（抗体检测）：

- 医生将查看您的检测结果。
- 如果结果为阳性，则表示您曾经感染 COVID-19。您可能对这种疾病产生免疫，但是医生不确定您是否可以避免再次患病或者保护时间持续多久。
- 如果结果为阴性，则表示您体内未对 COVID-19 产生抗体。这通常意味着您未受到感染。这也可能意味着您最近受到感染而您体内还没来得及产生抗体。
- 该检测有助于公共卫生官员跟踪此疾病。在辨别您是否有活动性感染方面帮助不大。

手术前会发生什么？

- 检测前无特殊事项可做。
- 告知您的医生关于：
 - 您正在服用的所有药物
 - 您是否存在任何出血问题

手术期间会发生什么？

进行此项检测只需要几分钟。您将始终保持清醒。

- **病毒检测：**工作人员会将拭子插入您的鼻内并来回移动。有时工作人员会擦拭鼻的两侧或咽喉。这可能不舒服，但只会持续几秒钟。
- **血液检查：**工作人员将使用针头从您体内采集少量血液。您可能会有轻微疼痛。工作人员将取出针头并在您的皮肤上缠上绷带。有时工作人员会刺破您的手指并采集少量血液进行检测。

手术后会发生什么？

- 站立前，您可能需要静坐几分钟。这将有助于防止您在检测后感到头晕。
- 如果您接受了血液检查，请用另一只手按压针头放置部位。这有助于防止瘀伤和出血。
- 咨询您的医生何时得到检测结果。

在家中需要哪些护理？

如果您认为自己患有 COVID-19 或曾接触过这种疾病的患者，请远离他人至少 14 天。

需要什么样的后续护理？

您的医生可能会要求您到其诊室接受回访，以了解您的恢复情况。请务必坚持这些访视。

可能会发生什么问题？

- 疼痛
- 瘀伤
- 出血

- 感觉头晕

消费者信息使用及免责声明:

这些信息不是特定的医疗建议，也不能替代您从您的医疗保健提供者处获得的信息。这仅仅是一般信息的简明概要。本信息并未包括有关状况、疾病、损伤、检查、手术、治疗、疗法、出院指导或生活方式选择（可能适用于您）的所有信息。您必须和您的医疗保健提供者讨论关于您的健康和治疗选择的完整信息。不应使用本信息决定是否接受您的医疗保健提供者的意见、指导或建议。只有您的医疗保健提供者具备可为您提供**适宜意见**的知识并接受过相应培训。



© 2021 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All Rights Reserved.