

Patient Education

2019 年冠狀病毒疾病 (COVID-19) 檢測

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

為何執行此程序（或做此手術）？

2019 年冠狀病毒疾病也稱為 COVID-19。係由一種稱為 SARS 相關冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 的病毒引起。醫師可能讓您接受一些檢測，看看您當前是否感染了 COVID-19。他們可能還會檢測您過去是否患過 COVID-19。

務必了解您所接受的檢測類型。醫師會透過病毒檢測來確定您是否患有 COVID-19。通常使用鼻腔或咽喉拭子。血液檢驗（驗血）是另一種 COVID-19 檢測，用於檢測您的身體是否已對該病毒產生抗體。如果您有抗體，則意味著您過去曾經感染過該病毒。

會是什麼結果？

病毒檢測（鼻腔或咽喉拭子）：

- 醫師將會查看您的檢測結果。醫師可能會得知您罹患疾病的徵候。這種疾病很容易傳播給他人，或者您患重病的風險可能更大。
- 如果結果為陽性，則表明您患有活動性感染。您可能有，也可能沒有這種疾病的症狀。
- 如果結果為陰性，那麼您很可能在檢測時沒有被感染。您的症狀可能由其他某種疾病引起。這並不意味著您不會感染 COVID-19。

血液檢驗（驗血）（抗體檢測）：

- 醫師將會查看您的檢測結果。
- 如果結果為陽性，則表明您曾經感染過 COVID-19。您可能對這種疾病有免疫力，但是醫師不知道您是否可以避免再次生病，也不知道能持續多長時間不會生病。
- 如果結果為陰性，則表明您的身體尚未對 COVID-19 產生抗體。大多數情況下，這意味著您沒有受到感染。這也可能意味著您最近感染了該病毒，而您的身體還沒有時間產生抗體。
- 這項檢測有助於幫助公共衛生官員追蹤該疾病，對判斷是否患有活動性感染沒有太大幫助。

手術前會發生什麼？

- 在檢測之前，無需做特別的事。
- 告知醫師下列事項：
 - 您正使用的所有藥物
 - 您是否有任何出血問題

手術期間會發生什麼？

進行此檢測只需幾分鐘。整個檢測期間，您將保持清醒狀態。

- **病毒檢測：**一名醫護人員將拭子插入您的鼻腔並四處移動。有時，醫護人員會在您的鼻子或喉嚨的兩側擦拭。這可能會讓人不舒服，但只會持續幾秒鐘。
- **血液檢驗（驗血）：**醫護人員將用針頭從您身上抽取少量血液。您可能會感覺輕微疼痛。醫護人員將拔出針頭並在您的皮膚上纏上繃帶。有時，醫護人員會戳刺您的手指並僅收集少量血液以進行檢測。

手術後會發生什麼？

- 在站立之前，您可能想靜坐幾分鐘。這將幫助預防您在檢驗後感覺暈眩。
- 如果您進行了血液檢驗（驗血），請用另一隻手在針頭處施壓。這可緩解瘀傷和出血。
- 詢問醫師您何時會得到檢驗結果。

家中需要哪些照護？

如果您認為自己感染了 COVID-19 或已經接觸過感染 COVID-19 的人，請與他人保持距離至少 14 天。

需要哪些後續照護？

醫師可能會要求您前來就診，以確認您的進展。請務必前往就診。

可能有出現哪些問題的風險？

- 疼痛
- 青腫
- 出血
- 感覺暈眩

消費者資訊使用與免責聲明:

此資訊並非特定的醫療建議，且無法取代保健服務提供者向您提供的資訊。這裡僅提供一般概要資訊。未囊括適用於您的關於身體狀況、疾病、傷害、檢測、手術、治療、療法、出院醫囑或生活習慣（方式）選擇等方面的全部資訊。您必須洽詢您的專業醫護人員，瞭解關於您健康狀況和

治療方法選擇的完整資訊。這裡的資訊不能代替專業醫護人員的建議、指示或推薦療法。只有您的保健服務提供者最瞭解您的狀況並接受過專業訓練，可為您提供最恰當的建議和指引。



© 2021 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All Rights Reserved.